

布洛芬口服溶液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称：布洛芬口服溶液

英文名称：Ibuprofen Oral Solution

汉语拼音：Buluofen Koufufurongye

【成份】本品每毫升含布洛芬0.01克。辅料为着色剂柠檬黄、防腐剂苯甲酸钠和桔子香精、薄荷脑。

【性状】本品为淡黄色至黄色溶液。

【作用类别】本品为解热镇痛类非处方药药品。

【适应症】用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解儿童轻至中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

【规格】10毫升：0.1克

【用法用量】口服，12岁以下儿童用量请见下表：

年龄(岁)	体重(公斤)	一次用量(毫升)	次数
1~3	10~15	7	若持续疼痛或发热， 可间隔4-6小时重复 用药1次，24小时不 超过4次。
4~6	16~21	10	
7~9	22~27	15	
10~12	28~32	20	

【不良反应】1、少数病人可出现恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良、胃肠道溃疡及出血、转氨酶升高、头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、精神紧张、嗜睡、下肢水肿或体重骤增。

2、罕见皮疹、过敏性肾炎、膀胱炎、肾病综合征、肾乳头坏死或肾功能衰竭、支气管痉挛。

【禁忌】1、对其他非甾体抗炎药过敏者禁用。

2、对阿司匹林过敏的哮喘患者禁用。

【注意事项】1、本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用，用于止痛不得超过5天，用于解热不得超过3天，症状不缓解，请咨询医师或药师。

2、有下列情况患者慎用：支气管哮喘、肝肾功能不全、凝血机制或血小板功能障碍（如血友病）。

3、下列情况患者应在医师指导下使用：有消化性溃疡史、胃肠道出血、心功能不全、高血压。

4、1岁以下儿童应在医师指导下使用。

5、不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。

6、如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。

7、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8、本品性状发生改变时禁止使用。

9、请将本品放在儿童不能接触的地方。

10、儿童必须在成人监护下使用。

11、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

12、如出现胃肠道出血或溃疡、胸痛、气短、无力、言语含糊等情况，应停药并咨询医师。

13、第一次使用本品如出现皮疹或过敏症状，应停药并咨询医师。

【药物相互作用】1、本品与其他解热、镇痛、抗炎药物同用时可增加胃肠道的不良反应，并可能导致溃疡。

2、本品与肝素、双香豆素等抗凝药同用时，可导致凝血酶原时间延长，增加出血倾向。

3、本品与地高辛、甲氨蝶呤、口服降血糖药物同用时，能使这些药物的血药浓度增高，不宜同用。

4、本品与呋塞米（呋喃苯胺酸）同用时，后者的排钠和降压作用减弱；与抗高血压药同用时，也降低后者的降压效果。

5、如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品能抑制前列腺素的合成，具有解热镇痛及抗炎作用。

【贮藏】密封，在阴凉处（不超过20℃）保存。

【包装】口服液瓶装，每支装10毫升，每盒6支。

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2015年版二部

【批准文号】国药准字H10950111

【说明书修订日期】2019年05月09日

【生产企业】

企业名称：神威药业集团有限公司

生产地址：河北省石家庄市栾城区石栾大街168号

邮政编码：051430

电话号码：(0311)88030066

传真号码：(0311)88030088

网址：<http://www.shineway.com>

售后服务电话：4006129208

电子邮件：info@shineway.com

如有问题可与生产企业联系

